

BIOFEED
Jesteśmy dla Ciebie!



KATALOG
PRODUKTÓW

produkty dla drobiu



Linia pasz BIOFEED „Tradycja z Natury” dedykowana jest w trosce o dobrostan drobiu przydomowego. Pozwala osiągnąć optymalne przyrosty oraz wysoką nieśność kur.

Wybór tej linii żywienia pozwala osiągnąć wysokie wyniki produkcyjne drobiu, uzyskiwane dzięki ograniczeniu obciążenia układu pokarmowego, poprzez zastosowanie naturalnych dodatków ziołowych pozwalających ograniczyć czynniki stresogenne. „Tradycja z Natury” polecana jest hodowcom ceniącym wysoką jakość w połączeniu z wynikami produkcyjnymi i dobrostanem swojego drobiu.

Nasze produkty rekomendujemy do gospodarstw nastawionych na bardzo dobre przyrosty, wysoką nieśność oraz niski współczynnik wykorzystania paszy.

Wysoka koncentracja składników pokarmowych w linii „Tradycja z Natury” BIOFEED dla drobiu w połączeniu z odpowiednim zarządzaniem stadem pozwala na uzyskanie najlepszych wyników produkcyjnych.




Wszystkie mieszanki paszowe z linii pasz dla drobiu przygotowane są w oparciu o naturalne surowce pochodzące od sprawdzonych dostawców. Nie zawierają antybiotyków.

„Tradycja z Natury” - linia w 100% z produktów BEZ GMO, wzbogacona o dodatek marchwi, pokrzywy oraz krwawnika pospolitego.





PISKLETA



Ogólne zasady utrzymania

Warunkiem prawidłowego prowadzenia chowu jest zapewnienie kurczętom i kurom optymalnych warunków środowiskowych niezbędnych do ich wzrostu, utrzymania i prowadzenia produkcji.

Przed przyjęciem piskląt pomieszczenia i sprzęt powinny być przygotowane przez:



umycie



dezynfekcję



rozłożenie ściółki



nagrzanie do właściwej temperatury





światło



Temperatura

Kurnik powinien być nagrany przed wstawieniem piskląt do ok. 31-33 stopni. Miernikiem właściwego nagrzania kurnika jest równomierne rozmieszczenie kurczaków. Skupianie kurcząt pod promiennikiem świadczy o zbyt niskiej temperaturze.

Gromadzenie kurcząt w karmnikach jest dowodem na złe podświetlenie lub zbyt niską temperaturą podłoża.



Skutki nieodpowiedniej temperatury:

- wodobrzusze – brak cyrkulacji, przegrzanie
- brak lub spowolnienie resorpcji woreczka żółciowego – chłodne powietrze



Światło

Światło ma istotny wpływ na łatwość oraz ilość pobieranej paszy i wody. Ma dodatni wpływ na rozwój i wzrost kurcząt. Właściwe oświetlenie zapewnia żarówka o mocy 60 KW na 15m² podłogi.



Karmienie i pojenie

W pierwszych dniach życia do karmienia piskląt można użyć papieru karbowanego, deseczki lub tacki plastikowej. W późniejszym etapie wstawić karmidła.


Pasza powinna wystawać 1,5-2 cm ponad brzeg, aby pisklęta nie wpadały do środka. Należy przy tym pamiętać aby ilość i wielkość karmideł była dostosowana do ilości sztuk, tak aby zapewniały swobodny dostęp do paszy.

Niezbędnym warunkiem dobrego odchovu jest stały dostęp do świeżej wody. Poidła powinny być myte każdego dnia by unikać pojenia zabrudzoną odchodami wodą. Woda powinna mieć odpowiednią temperaturę, szczególnie dla małych piskląt w okolicy 12 stopni.

Czynnikiem niezbędnym do utrzymania dobrego dobrostanu drobiu jest wymiana ściółki i dezynfekcja podłogi.



KURY ODCHOWANE PRZED OKRESEM NIEŚNOŚCI




W pierwszej kolejności należy przygotować miejsce stosowne do ilości kurcząt, które planujemy zakupić. Na jednym metrze kwadratowym kurnika możemy utrzymywać nie więcej niż 12 sztuk kurcząt odchowanych do wieku 16 tygodni.



- Pierwszą czynnością jest dokładne wysprzątanie przyszłego kurnika, następnie dezynfekcja i bielenie wapnem.
- Pomieszczenie dla kurcząt powinno być suche, wyścielone warstwą słomy lub wiórów o grubości, co najmniej 10 cm.
- Posadzka lub podłoga powinna być szczelna, by uniemożliwić dostęp do kurcząt drapieżnikom (zdarzają się ataki lisów, kun lub szczurów).
- Warto w naszym małym kurniku wybudować grzędę, która jest przez kurczęta bardzo chętnie wykorzystywana (konstrukcja podobna do drabiny o długich szczeblach rozstawionych co 50 cm, pochylona do ziemi pod kątem ok. 45 stopni).
- Okna w pomieszczeniu dla kurcząt umożliwiają wietrzenie kurnika, oraz powinny mieć możliwość zasłaniania, by chronić przed bezpośrednim światłem słonecznym, które często bywa przyczyną dziobania się kurcząt w pierwszej fazie odchovu.


Następnym elementem naszego kurnika będą urządzenia do karmienia i pojenia.




- Najprostszym rozwiązaniem są koryta lub podobne do nich zastępcze pojemniki. Lepszym rozwiązaniem są karmniki i poidła półautomatyczne przeznaczone specjalnie dla drobiu.
- Przy karmieniu kurcząt należy pamiętać o czyszczeniu poideł raz na dobę i dawkowaniu paszy suchej, by nie zalegała w karmidłach dłużej niż 3 dni. Przy zadawaniu paszy na mokro np. parowanych ziemniaków w upalne dni, należy pamiętać, by kurczęta zjadały podane dawki paszy w ciągu kilku godzin.
- Oświetlenie sztuczne o natężeniu ok. 1 W/m^2 (żarówka 25 W na $20\text{-}25 \text{ m}^2$ kurnika) należy stosować nocą w pierwszych 2 tygodniach po zakupie kurcząt by uniknąć przypadkowego spłoszenia stada w ciemnym kurniku i ewentualnego zaduszenia części kurcząt.
- Temperatura w kurniku dla 6-tygodniowych kurcząt powinna wynosić minimum 18 stopni Celsjusza, w przypadku niższej temperatury należy ściany obłożyć belkami ze słomy, by odizolować kurczęta od zimnych ścian i umożliwić ogrzewanie się wzajemne w ciasno ułożonym stadzie.

- Kur w różnym wieku (starych i młodych) nie powinno hodować się w jednym pomieszczeniu i na jednym wybiegu. Jeśli jednak prowadzi się wspólny chów, to należy zachować 3-tygodniowy okres przejściowy izolacji młodego stada od starych kur.
- Planując zakup kurcząt odchowanych należy zaopatrzyć się w mieszankę paszową. Dla zapewnienia prawidłowego wzrostu młodych ptaków należy zakupić co najmniej 1 kg mieszanki paszowej na sztukę. Przez pierwsze 2 tygodnie należy żywić kurczęta odchowane wyłącznie mieszanką pełnoporcjową, później można stopniowo dodawać zmielone zboże do mieszanki paszowej. Kurczętom można podawać: pszenicę, kukurydzę, pszenżyto, a w ograniczonych ilościach jęczmień, owies zwykły i nagi. Nie wolno podawać kurczętom żyta. Ograniczenia w stosowaniu zbóż spowodowane są obecnością substancji nietrawionych przez kurczęta, co prowadzi do biegunek. Przy stosowaniu mieszanek wilgotnych opartych na ziemniakach należy zwrócić uwagę na to, że w łupinach kiełkujących ziemniaków znajduje się solanina (pokarmowe zatrucia solaniną powodują biegunkę, wymioty, ślinotok, bóle głowy i senność).
- Czysta, świeża woda jest konieczna dla kurcząt by zaspokoić pragnienie oraz umożliwić kurczętom chłodzenie się w upalne dni. Kurczęta nie pocą się - mechanizm ochładzania polega na piciu zimnej wody i zianiu ciepłą parą wodną.

KURY W OKRESIE NIEŚNOŚCI



Dla kur niosek po 16 tygodniu życia zmienia się kilka parametrów.



- Ilość kur na metr kwadratowy to 4 do 6 sztuk.
- Sprzęt do karmienia i pojenia powinien być umieszczony na takiej wysokości, by brzeg karmidła lub poidła wypadał na wysokości grzbietu ptaka. Takie ustawienie sprzętu zabezpiecza przed nadmiernym rozsypywaniem mieszanki paszowej z karmideł i wychłapywaniem wody z poideł.
- Niezwykle ważnym elementem wyposażenia kurnika są gniazda do znoszenia jaj. Gniazdo powinno być umieszczone w kącie, bokiem lub tyłem do źródła światła i wejścia do kurnika.

Czasem słyszymy poglądy o tym, że tylko kury wylęzione np. w marcu dobrze się niosą. Poglądy te spowodowane są tym, że naturalna długość dnia od tego okresu układa się zgodnie z wymaganiami kurcząt a później kur. Hodowca korzystający z kurcząt wylęzonych w późniejszym okresie może skorzystać z tańszego i łatwiejszego odchovu późniejszych kurcząt, jednocześnie po 16 tygodniu życia wydłużając naturalny dzień świetlny światłem sztucznym.

W życiu kur niosek okres po 16 tygodniu jest niezwykle ważny, gdyż decyduje o terminie i sposobie wejścia w nieśność. Okres ten wymaga od hodowcy zwrócenia szczególnej uwagi na rozwój stada.



- Kura w tym okresie powinna otrzymywać pasze o wyższym poziomie białka (ok.16%) i dodatkowo należy w kurniku umieścić pojemnik z kredą paszową zmieszaną z piaskiem do uzupełnienia składników mineralnych niezbędnych do produkcji skorupy jaj.
- Jeśli zauważamy słabszą kondycję stada możemy dodatkowo podać preparat witaminowy zawierający witaminy A,D,E,C.
- Decydujące o terminie wejścia w nieśność zdrowego stada kur jest dawkovanie światła. Światło pobudza przysadkę mózgową kury do wydzielania hormonalnego, które wywołuje tworzenie się i dojrzewanie pęcherzyków jajowych. Po 16 tygodniu życia kura potrzebuje 10 godzin dziennie światła o natężeniu 2,5 W/m² (żarówka 40W na 15 m²). Stado 18 tygodniowe powinno mieć 12 godzin światła na dobę. Należy pamiętać, że natężenie światła w pochmurny jesienny dzień jest niewystarczające i powinno być zapalone światło sztuczne. Maksymalna długość dnia świetlnego to 14 do 15 godzin na dobę. Nigdy nie należy skracać w okresie nieśności czasu dnia świetlnego.

Dodatki ziołowe w paszach BIOFEED



Marchewka – β -karoten, zdrowy drób, dobre wybarwienie żółtka, prawidłowe trawienie



Pokrzywa – działanie przeciwbakteryjne, działanie przeciwzapalne, prawidłowe upierzenie



Krwawnik pospolity - działanie odkażające, działanie przeciwbiegunkowe, podnosi odporność

Zioła - ważne w żywieniu kur



Kury w naturalnych warunkach, gdy mają nieograniczony dostęp do różnego rodzaju roślinności chętnie zjadają takie zioła jak pokrzywa, mięta, szalwia, mniszek lekarski, krwawnik pospolity, rdest, melisę czy dziurawiec. Rośliny te zawierają wiele substancji aktywnych i od wieków były wykorzystywane w tradycyjnej medycynie ludowej do leczenia ludzi. Zioła spożywane przez kury wpływają pozytywnie na ich zdrowie, poprawiając trawienie i ogólną kondycję. Pobudzają do pracy przewód pokarmowy, zwłaszcza wątrobę i trzustkę, poprawiając także przyswajanie paszy. Poprawiają działanie układu odpornościowego oraz co ma nie mniejsze znaczenie - polepszają smak oraz zapach jaj i mięsa. Ze względu na zawartość szeregu witamin i związków mineralnych korzystnie wpływają na dobrostan naszych kur.

PISKLAK



SKŁAD OPARTY NA SUROWCACH:

- Pszenica, kukurydza, soja BEZ GMO
- Białko ogólne na poziomie 19%
- **Mikro-granulat**
- **Krwawnik pospolity**
- **Susz z marchwi**
- **Susz z pokrzywy**
- Wyśmienita kompozycja specjalnie dobranych zbóż, takich jak pszenica, kukurydza
- Śruta sojowa, jako główne źródło białka
- Odpowiedni udział witamin i składników mineralnych
- Mieszanka różnorodnych składników pokarmowych
- Okres stosowania od 0-7 tygodnia



NIOSKA PREMIUM – KRUSZONKA



SKŁAD OPARTY NA SUROWCACH:

- Kukurydza, otręby pszenne, soja BEZ GMO
- Białko ogólne na poziomie 16.5%
- Struktura – kruszonka
- **Krwawnik pospolity**
- **Susz z marchwi**
- **Susz z pokrzywy**
- Wysoka jakość i naturalne składniki paszy
- Bardzo smakowita
- Zaspokaja potrzeby pokarmowe ptaków w całym okresie użytkowania
- Pewne wyniki i satysfakcja z hodowli drobiu
- Nieśność na wysokim poziomie
- Okres stosowania od 16 tygodnia



KURCZAK



SKŁAD OPARTY NA SUROWCACH:

- Pszenica, kukurydza, soja BEZ GMO
- Białko ogólne na poziomie 16%
- Kruszonka
- **Krwawnik pospolity**
- **Susz z marchwi**
- **Susz z pokrzywy**
- Wyśmienita kompozycja specjalnie dobranych zbóż, takich jak pszenica, kukurydza
- Odpowiedni udział witamin i składników mineralnych
- Śruta sojowa, jako główne źródło białka
- Optymalnie zbilansowane mieszanki pełnoporcjowe
- Okres stosowania od 8-16 tygodnia



NIOSKA PREMIUM – SYPKA



SKŁAD OPARTY NA SUROWCACH:

- Kukurydza, pszenica, soja BEZ GMO
- Białko ogólne na poziomie 16.5%
- **Sypka mlewnikowana**
- **Krwawnik pospolity**
- **Susz z marchwi**
- **Susz z pokrzywy**
- Wyśmienita kompozycja specjalnie dobranych zbóż, takich jak pszenica, kukurydza
- Udział wapnia
- Śruta sojowa, jako główne źródło białka
- Odpowiedni udział witamin i składników mineralnych
- Okres stosowania od 16 tygodnia



NIOSKA – KRUSZONKA



SKŁAD OPARTY NA SUROWCACH:

- Pszenica, kukurydza, otręby pszenne, soja BEZ GMO
- Białko ogólne na poziomie 16%
- Kruszonka
- **Krwawnik pospolity**
- **Susz z marchwi**
- **Susz z pokrzywy**
- Okres stosowania od 16 tygodnia



BROJLER II



SKŁAD OPARTY NA SUROWCACH:

- Pszenica, kukurydza, soja BEZ GMO
- Białko ogólne na poziomie 19%
- **Granulat krótko cięty (średnica 3.2mm)**
- **Krwawnik pospolity**
- **Susz z marchwi**
- **Susz z pokrzywy**
- Wyśmienita kompozycja specjalnie dobranych zbóż, takich jak pszenica, kukurydza
- Śruta sojowa, jako główne źródło białka
- Odpowiedni udział witamin i składników mineralnych
- Mieszanka różnorodnych składników pokarmowych
- Mieszanka chętnie wyjadana przez brojlery
- Doskonale umięśnione brojlery
- Wysoka odporność na choroby
- Doskonale zbilansowana wartość odżywcza
- Okres stosowania od 15-35 dnia



BROJLER I



SKŁAD OPARTY NA SUROWCACH:

- Pszenica, kukurydza, soja BEZ GMO
- Białko ogólne na poziomie 20%
- **Mikro-granulat (idealna struktura)**
- **Krwawnik pospolity**
- **Susz z marchwi**
- **Susz z pokrzywy**
- Mieszanka chętnie wyjadana przez brojlery
- Doskonale umięśnione brojlery
- Wysoka odporność na choroby
- Doskonale zbilansowana wartość odżywcza
- Okres stosowania od 0-14 dnia



BROJLER III



SKŁAD OPARTY NA SUROWCACH:

- Pszenica, kukurydza, soja BEZ GMO
- Białko ogólne na poziomie 18%
- **Granulat (średnica 3.2mm)**
- **Krwawnik pospolity**
- **Susz z marchwi**
- **Susz z pokrzywy**
- Mieszanka chętnie wyjadana przez brojlery
- Doskonale umięśnione brojlery
- Wysoka odporność na choroby
- Doskonale zbilansowana wartość odżywcza
- Okres stosowania od 36 dnia do końca tuczu



KACZKA GĘŚ I



SKŁAD OPARTY NA SUROWCACH:

- Pszenica, kukurydza, soja BEZ GMO
- Białko ogólne na poziomie 20%
- **Mikro-granulat**
- **Krwawnik pospolity**
- **Susz z marchwi**
- **Susz z pokrzywy**
- Wyśmienita kompozycja specjalnie dobranych zbóż, takich jak pszenica, kukurydza
- Odpowiedni udział witamin i składników mineralnych
- Śruta sojowa, jako główne źródło białka
- Mieszanka różnorodnych składników pokarmowych
- Okres stosowania od 0-14 dnia



KACZKA GĘŚ II



SKŁAD OPARTY NA SUROWCACH:

- Pszenica, kukurydza, soja BEZ GMO
- Białko ogólne na poziomie 17%
- **Granulat (średnica 3.2mm)**
- **Krwawnik pospolity**
- **Susz z marchwi**
- **Susz z pokrzywy**
- Doskonale rosnące kaczki i gęsi
- Bardzo dobra jakość mięsa
- Pięknie upierzone kaczki i gęsi
- Optymalnie zbilansowane wartości odżywcze
- Okres stosowania od 14 dnia do końca tuczu



VITAMINKI

Opakowania: 2kg, 4kg



Mieszanki paszowe uzupełniające mineralno-witaminowo-aminokwasowe, przeznaczone dla piskląt, kurcząt, kur niosek, brojlerów oraz kaczek i gęsi w chowie przyzagrodowym.

Korzyści dla hodowcy

- Prosty sposób zastosowania
- Uzupełnienie składników mineralnych i witamin w paszach gospodarskich dla drobiu
- Zapobieganie stratom powstającym w wyniku niedoborów wapnia (łamliwość kości, krucha skorupa)

Korzyści dla zwierzęcia

- Wysoka zawartość wapnia zapewnia doskonałą kondycję układu kostnego
- Witaminy poprawiają odporność i dobrostan ptaków
- Aminokwasy zapewniają zrównoważony rozwój organizmu
- Możliwość zadania do wody lub do paszy

VITAMINKI



KONCENTRATY

NIOSKA KOLOR 25%



Mieszanka posiada w swym składzie optymalnie zbilansowane aminokwasy egzogenne oraz białko ogólne, zawiera także wszystkie niezbędne makroelementy, mikroelementy oraz witaminy w łatwo przyswajalnej formie.

Dzięki stosowaniu mieszanki Nioska Kolor można łatwo przygotować paszę pełnoporcjową na wszystkie okresy żywieniowe i żywić jednym produktem wszystkie gatunki drobiu domowego utrzymywanego w chowie przyzgodowym.

Koncentrat Nioska kolor to mieszanka przeznaczona do żywienia kur niosek. Zastosowanie produktu pozwala na wykorzystanie własnych zbóż w celu przygotowania wysokiej jakości mieszanki pełnoporcjowej. Koncentrat Nioska Kolor charakteryzuje się odpowiednio dobranym składem pokarmowym i powstaje z komponentów najwyższej jakości.

PRZYKŁADY MIESZANIA

KOMPONENTY	3 wersje mieszania koncentratu :		
	I wersja	II wersja	III wersja
KUKURYDZA	30%	35%	40%
PSZENICA	15%	15%	20%
PSZENŻYTO	20%	15%	10%
JĘCZMIEŃ	5%	5%	-
KREDA	5%	5%	5%
Nioska Kolor 25%	25%	25%	25%
RAZEM	100%	100%	100%

OSUSZANIE POMIESZCZEŃ GOSPODARSKICH

BACTERIOSAN DRY

Opakowanie: 20kg



produkt do osuszania pomieszczeń inwentarskich

- skutecznie osusza posadzki budynków inwentarskich poprawiając mikroklimat pomieszczeń
- wiąże szkodliwe gazy w tym amoniak i siarkowodór
- ogranicza rozwój larw much i innych niepożądanych owadów
- do stosowania w obecności zwierząt, brak karencji
-

Stosowanie: 40-100g/m²

Niniejszy materiał / katalog / ma jedynie charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu prawa w tym w tym m.in. nie jest ofertą zawarcia umowy. Biofeed sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne błędy w katalogach, broszurach i innych materiałach drukowanych lub elektronicznych. Biofeed sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w cenach lub produktach bez uprzedzenia, co obejmuje także produkty już zamówione. Zamienniki mogą być dostarczone bez dokonywania jakichkolwiek zmian w specyfikacjach już uzgodnionych. Wszystkie znaki towarowe w tym materiale są własnością odpowiednich firm i podlegają odrębnej ochronie prawnej. Znaki towarowe Biofeed sp. z o.o. są własnością Biofeed sp. z o.o. oraz są objęte ochroną prawną w tym prawami autorskimi. Zdjęcia umieszczone w katalogu są zdjęciami poglądowymi i produkty w rzeczywistości mogą się różnić od zamieszczonych ilustracji. Publikacja jest chroniona prawem autorskim. Kopiowanie, przedrukowywanie i rozpowszechnianie całości lub fragmentów, również na nośnikach magnetycznych lub elektronicznych bez zgody uprzedniej pisemnej zgody Biofeed sp. z o.o. jest zabronione.

BIOFEED
Jesteśmy dla Ciebie!



BIOFEED Sp. z o.o.

Rajkowy, ul. Jesionowa 28
83-130 Pelplin

BIURO EKSPORTOWE

ul. Kartuska 489
80-298 Gdańsk

KONTAKT

tel./fax: +48 89 758 81 48

e-mail: biuro@biofeed.pl

<https://www.facebook.com/Biofeed.Jestesmydlaciebie/>

<https://www.facebook.com/Biofeed.Zoo/>

WYTWÓRNIE

Rajkowy ul. Jesionowa 28, 83-130 Pelplin

Zalewo ul. Kilińskiego 8a, 14-230 Zalewo

Pasłęk ul. Bohaterów Westerplatte 43, 14-400 Pasłęk

Blok Dobryszycze, ul. Dobryszycza 22, 97-505 Dobryszycze